



# ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร การระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ในจังหวัดพัทลุง

## หนอนร่านกินใบ (Leaf eating caterpillar)

### ชื่อวิทยาศาสตร์

- *Parasa lepida* Cramer

### รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

- ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อขนาดกลาง ลำตัวอ้วนสั้นมีขนปกคลุมเพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วก็เริ่มวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ละ ๒๐ - ๖๐ ฟอง บริเวณใต้ใบ ไข่มีสีเหลืองอ่อนกลมแบนวางซ้อนกันมองคล้ายเกล็ดปลา ระยะไข่ ๕ - ๗ วัน หนอนมีลำตัวสีเขียวมีขนแข็งขึ้นเป็นกระจุกเรียงเป็นแถวตลอดลำตัว ขนแข็งนี้เมื่อไปถูกเข้าจะทำให้รู้สึกปวดเสียวปวดร้อนและเป็นผื่นแดง หนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกระจุก เมื่อโตขึ้นจะกระจายไปตามใบต่าง ๆ ระยะหนอน ๓๔ - ๔๙ วัน หนอนจะสร้างรังมีใยปกคลุม และเข้าดักแด้ตามใบและกิ่ง ลักษณะดักแด้เป็นก้อนแข็งกลมสีน้ำตาลเข้ม ระยะดักแด้ ๒๑ - ๒๖ วัน แล้วจึงเจริญเป็นตัวเต็มวัย



### ลักษณะการทำลาย

- ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะแทะกินแต่ผิวใบเท่านั้น ทำให้ใบแห้งและร่วง โดยปกติแล้วหนอนชนิดนี้ทำความเสียหายไม่มากนัก แต่ถ้ามีการระบาดในระยะที่เงาะกำลังออกดอกจะทำให้เงาะเสียหายมาก เพราะต้นที่ถูกทำลายจะติดผลขนาดเล็ก และด้อยคุณภาพ

### ศัตรูธรรมชาติ

- มีแมลงเบียนพวกแตน (Hymenoptera) คอยทำลายในระยะที่เป็นตัวหนอน นอกจากนั้นยังมีโรคคอยทำลายอยู่ด้วย

### การป้องกันและกำจัด

๑. หมั่นสำรวจศัตรูพืช ถ้าพบใบเงาะแห้งหรือมีร่องรอยทำลายตรวจดูหนอน ถ้าพบตัวหนอนยังเล็กอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ให้นำใบเงาะไปทำลายเสีย
๒. เมื่อพบหนอนระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารคาร์บาริล (เซฟวิน ๘๕% WP) ในอัตรา ๒๕ - ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ให้ทั่ว