



ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร การระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ในจังหวัดพัทลุง

โรคเส้นดำในยางพารา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ขอแจ้งเตือนภัย ศัตรูพืช ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้เกษตรกร ได้เฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมเมื่อพบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ช่วงนี้บ้านเราเข้าสู่ฤดูมรสุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคเส้นดำที่เกิดบริเวณหน้ากรีด เราสามารถสังเกตอาการของโรคและวิธีป้องกันกันดีกว่า

โรคเส้นดำในยางพารามีเชื้อราเป็นสาเหตุของโรค เกิดขึ้นบริเวณหน้ายางที่ผ่านการกรีดมาแล้ว จะมีลักษณะเป็นรอยขีด ต่อมาจะกลายเป็นรอยบวมสีดำหรือ



สีน้ำตาลดำตามแนวยาวของลำต้น เมื่อเดือนเปลือกตรงรอยบวมสีดำจะเห็นลายเส้นสีดำบนเนื้อไม้ยางพาราและอาจลุกลามลงใต้รอยกรีดหรือเหนือรอยกรีด ถ้าอาการรุนแรงเปลือกยางพาราบริเวณที่เป็นโรคจะปริแตก มีน้ำยางไหล เปลือกจะเน่าหลุดออกมา ถ้าการเข้าทำลายของเชื้อไม่รุนแรง เปลือกยางที่งอกใหม่จะเป็นปุ่มปม เมื่อความชื้นสูงกว่า ๙๐% หน้ากรีดจะเปียกอยู่ตลอดเวลา เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อ อาการขึ้นรุนแรง จะทำให้เปลือกของหน้ายางบริเวณที่เป็นโรคปริ มีน้ำยางไหลออกมาตลอดเวลา และเปลือกบริเวณที่เป็นโรคนี้จะเน่าหลุดออกทั้งหมดในที่สุด การแพร่ระบาด เชื้อจะเข้าทำลายได้เฉพาะบริเวณเปลือกยางที่มีบาดแผลเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเข้าทำลายทันทีที่ทางรอยกรีดใหม่ที่กรีดไปแล้วไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โรคนี้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในพื้นที่ปลูกยางพันธุ์อ่อนแอ โดยเฉพาะในเขตที่เกิดโรคใบร่วงและผลเน่าระบาดเป็นประจำทุกปี

การป้องกัน

๑. ไม่ควรปลูกพืชอาศัยเป็นพืชแซมยาง เช่น มะละกอ แตงโม ส้ม ทุเรียนพริกไทย โกโก้ มะพร้าว ยาสูบ
๒. หลีกเลี่ยงการเปิดกรีดยางในฤดูฝน ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรง
๓. ระยะที่มีโรคใบร่วงระบาดให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาหน้ายางหรือฉีดพ่น หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันโรคที่หน้ากรีดแนะนำให้ใช้เมทาแลกซิล ฟอสเอทิลอลูมิเนียม ทาที่หน้ากรีดหรือทาเหนือรอยกรีดภายใน ๑๒ ชั่วโมงหลังการกรีดยางทุกสัปดาห์
๔. ถ้าพบอาการที่หน้ากรีด ต้องเชือนส่วนที่เป็นโรคออกก่อนแล้วทาด้วยสารเคมีชนิดเมทาแลกซิลฟอสเอทิลอลูมิเนียม อัตราตามคำแนะนำ ผสมสารจับใบ ๒ ซีซี พ่นหรือทาหน้ากรีดยางทุก ๕ - ๗ วัน