



ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร การระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ในจังหวัดพัทลุง

เตือนการระบาดของศัตรูพืช มวนลองกอง (Fruit Sporting Bug)

เตือนเกษตรกรผู้ทำสวนลองกองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในระยะนี้ควรหมั่นสำรวจแปลงลองกอง อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากช่วงนี้พบมวนลองกองเข้าทำลายผล ลองกอง ทั้งผลอ่อนและผลแก่ ทำให้ผลแกรนเล็ก หลุดร่วง ผิว เมื่อสุกจะมีจุดสีดำ จากการถูกดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตลองกองเป็นอย่างมาก

ชื่อสามัญ Fruit Sporting Bug

ชื่อวิทยาศาสตร์ Paradasynus sp.

อันดับ Hemiptera

วงศ์ Coreidae

มวนสกุลนี้จะวางไข่เป็นกลุ่มเรียงเป็นแถวใต้ใบ หรือตรง ส่วนก้านใบพืช ตัวอ่อนฟักออกจากไข่หลังจากวางไข่ได้ประมาณ

๗ วัน ตัวอ่อนที่เพิ่งฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะยังไม่มีการพัฒนาของส่วนปากและอวัยวะอื่นๆ จากนั้นประมาณ ๑๕ วัน ตัวอ่อนก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตัวอ่อนมีทั้งหมด ๕ วัย วงจรชีวิตรวมทั้งหมดตั้งแต่ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ ๖๒-๖๔ วัน และตั้งแต่เป็นตัวอ่อนระยะสุดท้ายจนถึงสิ้นอายุขัยประมาณ ๗-๑๐ วัน



กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดดังนี้

๑. ใช้สวิงโฉบจับตัวอ่อน และตัวเต็มวัยช่วงเวลาเช้า เย็น
๒. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไข่ *Chrysochalcissa oviceps* Boucek และ *Gryon* sp.
๓. เก็บกลุ่มไข่ที่อยู่ตามใบวัชพืชไปทำลาย
๔. ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เช่น Fipronyl ๕ % (sc) อัตรา ๑๑.๗๖ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และ Carbaryl ๐.๐๕ % อัตรา ๒๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นติดต่อกัน ๒ ครั้ง ห่างกันครั้งละ ๗ วัน