



ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร การระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ในจังหวัดพัทลุง

ศัตรูพืชระบาดในนาข้าว

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง แจ้งศัตรูพืชระบาดในนาข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมเมื่อพบปัญหาการระบาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ช่วงฤดูกาลทำนาปีของจังหวัดพัทลุง จะเริ่มฤดูกาลในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของทุกปี

สำหรับในช่วงต้นฤดูกาลเกษตรกรมักพบปัญหาศัตรูพืชระบาดเป็นประจำ และเป็นปัญหาที่ทำให้เกษตรกรได้รับ

ความเสียหายอย่างกว้างขวางทุกปี คือ วัชพืช และหอยเชอรี่ ฯลฯ

๑) วัชพืช : จะแย่งแย่งอาหารจากต้นข้าวทำให้ผลผลิตข้าวลดลง วัชพืชที่สำคัญที่พบในจังหวัดพัทลุง มีดังนี้

๑.๑ วัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าสีชมพู หญ้าดอกขาว (หญ้าลิเก) หญ้าแดง เป็นต้น

๑.๒ วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ผักบุ้ง เทียนนา ฯลฯ

๑.๓ วัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก กกสามเหลี่ยม

การป้องกันกำจัดเมื่อพบการระบาด

๑. การเตรียมดิน : ไถดะทิ้งไว้ ๗ – ๑๕ วัน และไถแปรทิ้งไว้ ๗ - ๑๕ วัน แล้วทำการคราดซังน้ำ ๒ วันระบายน้ำออกและปรับระดับเทือกพร้อมซังร่อง

๒. การจัดการเมล็ดพันธุ์ : เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ ต้องปราศจากสิ่งเจือปนหรือเมล็ดวัชพืช โดยการใช้เครื่องเป่า ผัด (ควัด) หรือเลือก

๓. การใช้วิธีกล : ใช้แรงคน โดยการถอนอย่างน้อย ๓ ครั้ง ตลอดฤดูกาล (ระยะกล้า ระยะแตกกอ ก่อนวัชพืชออกดอก)

๔. การควบคุมระดับน้ำ : ใช้ระดับน้ำควบคุมวัชพืชหลังจากข้าวตั้งตัวแล้ว เพื่อทำลายต้นอ่อนของวัชพืช

๕. เลือกใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตามคำแนะนำ

๒) หอยเชอรี่ : ทำลายต้นข้าว โดยการกัดกินต้นข้าว ตั้งแต่ระยะกล้า – ระยะแตกกอ ทำให้เกษตรกร ต้องเพิ่มต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าซ่อมแซมและการเตรียมดินใหม่



การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่

การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ ต้องทำในรูปของชุมชนต่างคนต่างทำจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากหอยเชอรี่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกสภาพภูมิอากาศ ในสภาพดินที่ไม่มีน้ำได้นานประมาณ ๖ เดือน

๑. รณรงค์การกำจัดหอยเชอรี่ก่อน – หลังการเพาะปลูก ทำอย่างต่อเนื่อง
๒. ทางน้ำไหลเข้าแปลงนาต้องป้องกันไม่ให้หอยเชอรี่ (ตัวเล็ก-ใหญ่) ติดตามมากับน้ำโดยการทำพังกั้นตามช่องน้ำที่ไหลเข้าแปลงนา
๓. การสูบน้ำเข้าแปลงนา ต้องใช้ตาข่ายกรองไม่ให้หอยเชอรี่ตั้งแต่ตัวเล็ก-ใหญ่ ติดไปกับน้ำ
๔. ทำหลุมล่อ : ทำหลุมล่อตามมุมแปลงนา แล้วนำตาข่ายล้อมรอบหลุมล่อ เปิดช่องไว้ ๑-๒ ช่อง แล้วนำพืชอาหารที่หอยเชอรี่ชอบกิน เช่น ใบมันสำปะหลัง ใบมะละกอ ไปสุมไว้ในหลุมล่อแล้วจับทำลาย
๕. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของหอยเชอรี่ เช่น นกกระยาง นกกระปูด (นกคุด) ฯลฯ
๖. การใช้สารเคมีไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากจะมีผลต่อการปฏิบัติในแปลงนาของเกษตรกร จากเปลือกของหอยที่ตายในแปลงนา หากมีความจำเป็นจริง ๆ แนะนำให้ใช้สารเคมีที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเท่านั้น